Bia

Vass4R07s481-485

Vass4R07s481-485

Collection Vassal-Montpellier

0Mtn116

domindantadantadantad

Bra Stare h R7 1481-485



dontodontodontodontod



dontordontordontordontord



dontodontodontodontod

N° d'ordre :

Désignation : Bia

Emplacement: 4 R 4 S. 481-485

# (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (82) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duvateux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 218 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièmement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure: blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou ouivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

## Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

#### Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

57/97

N° d'ordre :

Désignation : Bia.

Emplacement: 4 R 7 S. 481- 485.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORATSON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.

sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 49 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte (60) - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

# (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moven - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Jan 197

# Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

Année : 1998

Code cépage :

Code clone

Nom cépage : Bia

Observateur : Lacombe

Emplacement: 4 R7 481-485

#### Feuille adulte

oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 - grande 7 - très grande 9. oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3)- orbiculaire 4 - réniforme 5. oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2 - cinq(3) - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5)- vert foncé 7. oiv 070 pigmentation anthocyanique nervures face supérieure limbe : nulle 1 - point pétiolaire rouge 2- rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4. oiv 071 pigm. antho. nerv. face inf. limbe: nulle 1 - point pétiolaire rouge 2)- rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 072 gaufrure limbe (entre nervures II et III) : absente (1)- présente 9. oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I et II) : absente 1)- présente 9 oiv 074 profil: plan 1 - en gouttière(2)- involuté 3 - révoluté 4- tourmenté 5. oiv 075 cloqure face supérieure limbe : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible(3)moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087\* densité poils dressés face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible (3) moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 1) - présente 9 oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente (1)- présente 9.

#### Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible (1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 plus long 7 - beaucoup plus long 9

Densité poils couchés limbe face supérieure : nulle ou très faible (1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1/- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 très forte 9

Couleur du pétiole: vert 178 - partiellement coloré 177 - coloré 176

# Formulaire de description 5/8 (maturité)

Année: 1999	Observateur:
Code cépage: Code clone:  Nom cépage: Bro Malle Noir Grappe  Grappe	Emplacement: 4 R7 s481-485
	> .
oiv 202 longueur : très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9. oiv 203 largeur : très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9. oiv 204 compacité : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.	
oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm)(3 -) moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7. oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2	
oiv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4.	
Baie	
oiv 220 longueur : très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9.  oiv 221 largeur : très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9.  oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3  oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2 elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 -	
cylindrique 7 - arquée 8.  oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6.  oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2.	
oiv 227 <b>pruine</b> : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 + forte 7 - très forte 9. oiv 228 <b>épaisseur pellicule</b> : très mince 1 - mince 3 + moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9. oiv 229 <b>ombilic</b> : peu apparent 1 apparent 2.	
oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée 1 colorée 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée 1 coloration faible 3 - coloration moyenne 5 - forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2.	
oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7. oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9. oiv 236 saveur : aucune 2 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5.	
oiv 236* saveur: aucune 1- goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4. oiv 238 longueur pédicelle: très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.	
oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 difficile 7 - très difficile 9.  oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3.  oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9.  oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 -	
moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépi	g) 9.

# Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année: 2000

Code clone

Observateur

Code cépage : Nom cépage :

Emplacement: 4 R7 & 481-485

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

taille en 1839

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence 1 - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence 1 - présence 9

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (~60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand

(14mm) 7 - très grand (>17mm) 9

### Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Vassal

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3